

COMMENT PRENDRE UN ÉCHANTILLON DE FUMIER POUR COPROLOGIE

Les coprologies font partie intégral du programme de contrôle parasitaire de vos chevaux. L'obtention d'un bon échantillon est facile mais doit être fait adéquatement pour avoir un résultat juste et concluant. Voici les points importants :

- 1- Il existe des délais important à respecter entre l'administration d'un vermifuge et la prise de l'échantillon :
 - Moxidectin : 16 semaines (Quest, Quest Plus...)
 - Ivermectin: 12 semaines (Eqvalan, Eqvalan Gold, Equimax...)
 - Pamoate de Pyrantel: 8 semaines (Exodus, Strongid...)
 - Fenbendazole : 8 semaines (Panacur, Safe Guard...)
- 2- Les fumiers échantillonnés doivent être **frais de moins de 12 heures**. Idéalement on devrait échantillonner au moins 3 « tas » différents pour avoir un bon échantillon.
- 3- En utilisant un grand sac zip-lock à l'envers sur votre main, prenez une petite quantité de fumier **au centre** de chaque tas frais que vous voyez. La grosseur de l'échantillon finale devrait être la taille d'une petite orange.
- 4- Fermez le sac de façon étanche en **retirant le plus d'air possible**.
- 5- Écrivez votre nom et le nom de votre cheval ainsi que la date sur le sac.
- 6- Gardez votre échantillon dans le réfrigérateur (**frais et à l'abri de la lumière** du soleil) avant de l'apporter au bureau dans les **24 heures**.

MISE EN GARDE : La congélation et la chaleur intense tueront les œufs de parasites, rendant ainsi l'analyse inutile.